

USE
OF
HPPD INHIBITORS
AS
SELECTION AGENTS
IN PLANT TRANSFORMATION

Frederic Garcon
-and-
Bernard Pelissier

PATENT APPLICATION
(In French)
-with-
LIST OF SEQUENCES
-and-

Two (2) Sheets of Drawings

PM00053 (5500*101)

"Express Mail" mailing label
number EK219526068

Date of Deposit
-August 02, 2001-

I hereby certify that this paper or fee is
being deposited with the United States Postal
Service "Express Mail" Post Office to
Addressee" service under 37CFR 1.10 on the
date indicated above and is addressed to Box
PATENT APPLN., Comm. of Patents,
Washington, D.C. 20231

-Barbara J. Miller-

(Typed or printed name of person mailing
paper or fee)

(Signature of person mailing paper or fee)

Utilisation d'inhibiteurs d'HPPD comme agents de sélection dans la transformation de plantes

La présente invention concerne l'utilisation d'inhibiteurs d'HPPD comme agents de
5 sélection dans la transformation de cellules végétales et de plantes par génie génétique. La
transformation de cellules végétales et de plantes par génie génétique consiste
généralement à introduire un gène étranger, ou hétérologue codant pour une protéine
d'intérêt, dans le génome des cellules végétales et des plantes qui les contiennent. Ce gène
hétérologue une fois intégré dans le génome des cellules végétales est alors exprimé pour
10 conférer aux dites cellules et aux plantes qui les contiennent un nouveau caractère lié à la
fonction du gène hétérologue qui sera exprimé.

De nombreuses techniques de transformation des cellules végétales et de plantes par
génie génétique ont été développées et abondamment décrites dans la littérature. On pourra
distinguer d'une part les méthodes cherchant à introduire un fragment d'ADN porteur du
15 gène hétérologue sous forme dite d'ADN nu. Il s'agit notamment de bombarder des
cellules, des protoplastes ou des tissus avec des particules auxquelles sont accrochées les
séquences d'ADN. D'autres méthodes peuvent être utilisées telles que la micro-injection ou
l'électroporation, ou encore la précipitation directe au moyen de PEG. On distinguera
d'autre part les méthodes consistant à utiliser comme moyen de transfert dans la plante un
20 gène chimère hétérologue dans un plasmide Ti d'*Agrobacterium tumefaciens* ou Ri
d'*Agrobacterium rhizogenes*. L'homme du métier fera le choix de la méthode appropriée en
fonction de la nature de la cellule végétale ou de la plante à transformer. On citera
notamment les brevets et demandes de brevet suivants: US 4,459,355, US 4,536,475, US
5,464,763, US 5,177,010, US 5,187,073, EP 267,159, EP 604 662, EP 672 752, US
25 4,945,050, US 5,036,006, US 5,100,792, US 5,371,014, US 5,478,744, US 5,179,022, US
5,565,346, US 5,484,956, US 5,508,468, US 5,538,877, US 5,554,798, US 5,489,520, US
5,510,318, US 5,204,253, US 5,405,765, EP 442 174, EP 486 233, EP 486 234, EP 539
563, EP 674 725, WO 91/02071 et WO 95/06128.

Les méthodes de transformation de cellules végétales comprennent généralement les
30 étapes suivantes:

- a) préparation de cellules végétales compétentes aptes à recevoir le gène
hétérologue dans un milieu approprié,
- b) transformation des cellules compétentes avec le gène hétérologue

c) croissance et sélection des cellules transformées comprenant le gène hétérologue dans un milieu approprié.

Les cellules végétales compétentes peuvent être des cals embryogéniques, des cultures cellulaires sur support solide ou en suspension, ou des tissus embryogéniques, bien connus de l'homme du métier et largement décrits dans la littérature.

L'obtention de plantes transgéniques, comprenant le gène hétérologue intégré dans son génome, consiste ensuite à effectuer les étapes suivantes de :

d) régénération de plantes à partir des cellules transformées dans un ou plusieurs milieux appropriés, et le cas échéant,

e) obtention et récupération des graines des plantes transformées fertiles.

La pollinisation des plantes régénérées pour l'obtention des graines des plantes transformées fertiles s'effectue soit par auto-pollinisation, soit par pollinisation croisée avec une variété non transformée de la même plante, ou éventuellement avec une autre variété ayant intégré de manière stable dans son génome un autre gène hétérologue.

Les graines des plantes transformées sont employée ensuite dans des programmes de sélection classique pour l'obtention de nouvelles variétés de plantes transgéniques ayant intégré le gène hétérologue de manière stable dans leur génome. De tels programmes de sélection sont bien connus de l'homme du métier et comprennent l'évaluation des propriétés agronomiques des plantes obtenues et de leur descendance, en particulier vis à vis des propriétés agronomiques liées à l'expression du gène hétérologue.

La sélection des cellules transformées est effectuée au moyen d'un gène marqueur de sélection. De tels gènes marqueurs et leur utilisation pour la transformation d'organismes hôtes sont bien connus de l'homme du métier et largement décrits dans la littérature.

Parmi les gènes codant pour des marqueurs de sélection, on peut d'une part les gènes codant pour des enzymes facilement identifiables comme l'enzyme GUS (ou GFP. " Green Fluorescent Protein "), des gènes codant pour des pigments ou des enzymes régulant la production de pigments dans les cellules transformées. On citera d'autre part les gènes de résistance aux antibiotiques et les gènes de tolérance aux herbicides (bialaphos, glyphosate ou isoxazoles). Dans ce cas, la sélection s'effectue en introduisant dans le milieu approprié pour la croissance et la sélection des cellules transformées un agent de sélection de type antibiotique ou herbicide qui est létal pour les cellules non transformées, seules les cellules comprenant le gène de résistance aux antibiotiques ou aux herbicides étant capables de croître sur le milieu de sélection. De tels gènes marqueurs de sélection sont notamment

décrits dans les demandes de brevet EP 242 236, EP 242 246, GB 2 197 653, WO 91/02071, WO 95/06128, WO 96/38567, WO 97/04103 ou WO 99/24585.

Les gènes marqueur de sélection sont introduits dans les cellules hôtes de manière simultanée avec le gène hétérologue, soit dans un même vecteur, les deux gènes étant
5 associés de manière convergente, divergente ou colinéaire (WO 95/06128, US 5 731 179), ou encore dans deux vecteurs employés simultanément pour la transformation des cellules végétales. Dans certaines conditions (US 5 731 179) et notamment dans le cas où le gène hétérologue et le gène marqueur de sélection sont introduit séparément dans deux vecteurs de manière simultanée, le gène hétérologue codant pour une protéine d'intérêt et le gène
10 marqueur de sélection peuvent s'intégrer sur deux chromosomes différents dans le génome de la plante transformée. Il est possible, après récupération de plantes transformées fertiles d'éliminer le gène marqueur pour n'obtenir des plantes transformées ne comprenant que le gène hétérologue codant pour une protéine d'intérêt. Cette élimination se fait par autofécondation ou croisement des plantes transformées comprenant le gène hétérologue
15 et le gène marqueur de sélection avec une variété non transformée de la même plante, la ségrégation des deux gènes s'effectuant de manière Mendélienne classique.

Lorsque le gène hétérologue codant pour une protéine d'intérêt est un gène de tolérance herbicide, on peut employer le seul gène hétérologue comme marqueur de sélection dans le procédé de transformation des cellules végétales ou des plantes.

20 L'utilisation de gènes de tolérance aux herbicides inhibiteurs d'HPPD comme marqueurs de sélection dans les procédés de transformation des cellules végétales et des plantes a été décrite dans la littérature (WO 96/38567, WO 99/24585). L'inhibiteur d'HPPD est introduit dans le milieu de culture des cellules après transformation (étape c), à l'instar des autres agents de sélections selon les pratiques habituelles de l'homme du
25 métier. Les inhibiteurs d'HPPD agissent sur les cellules végétales en inhibant la synthèse des plastoquinones et des caroténoïdes. Cette action conduit à un blanchiment des cellules végétales qui n'est pas dommageable à la croissance des dites cellules, plus particulièrement dans le cas de tissus embryogénique. Seules les cellules végétales transformées comprenant le gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD restent vertes et
30 peuvent être sélectionnées, se distinguant ainsi des cellules non transformées.

La présente invention consiste en une amélioration d'une telle utilisation de manière à faciliter le processus d'identification et de sélection des cellules transformées. Un second objet de la présente invention consiste à diminuer le temps nécessaire à la sélection des plantes transformées, et à l'obtention de plantes régénérées fertiles. En effet, le processus

général de transformation, sélection, régénération et récupération des graines de plantes transformées fertiles peut prendre plusieurs mois selon les plantes considérées, de l'ordre de 10 à 18 mois, notamment pour des plantes telles que le soja. La réduction de cette durée de un ou plusieurs mois constitue un avantage technologique et économique certain.

- 5 La présente invention consiste introduire l'inhibiteur d'HPPD dans le milieu de culture des cellules végétales compétentes (étape a) de manière à blanchir les dites cellules avant l'étape de transformation. Les cellules compétentes blanchies sont ensuite transformées avec un gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comme marqueur de sélection et les cellules transformées ayant intégré ledit marqueur de sélection dans leur
- 10 génome verdissent, permettant leur sélection. Un tel procédé permet de réduire le temps nécessaire à la sélection des cellules transformées de plusieurs mois, de l'ordre de 2 à 3 mois.

La présente invention consiste donc en un procédé de transformation de cellules végétales par l'introduction d'un gène hétérologue dans lesdites cellules végétales avec un

15 gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comme marqueurs de sélection, ledit procédé comprenant les étapes de

- a) préparation et culture de cellules végétales compétentes aptes à recevoir le gène hétérologue dans un milieu approprié,
- b) transformation des cellules compétentes avec le gène hétérologue et le
- 20 marqueur de sélection,
- c) croissance et sélection des cellules transformées comprenant le gène hétérologue dans un milieu approprié.

caractérisé en ce que l'on effectue une étape de blanchiment des cellules végétales compétentes avant l'étape de transformation (b), en introduisant dans le milieu approprié

25 de culture des cellules végétales compétentes une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD.

La présente invention consiste également en l'obtention de plantes transgéniques, comprenant le gène hétérologue intégré dans son génome, consiste ensuite à effectuer les étapes suivantes de :

- d) régénération de plantes à partir des cellules transformées sélectionnées dans
- 30 un ou plusieurs milieux appropriés, et le cas échéant,
- e) obtention et récupération des graines des plantes transformées fertiles.

De manière préférentielle les plantes transgéniques obtenues par le procédé selon l'invention sont des plantes transgéniques fertiles.

Les cellules végétales selon l'invention peuvent être des cellules végétales de plantes monocotylédones ou dicotylédones, plus particulièrement des plantes de culture destinées ou non à l'alimentation animale ou humaine, de préférence dicotylédones, notamment le tabac, le colza, la betterave à sucre, les pommes de terre, le coton, ou le soja, de manière plus préférentielle le soja.

Les cellules végétales compétentes peuvent être des cals embryogéniques, des cultures cellulaires sur support solide ou en suspension, ou des tissus embryogéniques, bien connus de l'homme du métier et largement décrits dans la littérature. De manière avantageuse, les cellules végétales compétentes sont des tissus embryogéniques prolifératifs, maintenus préférentiellement dans un milieu semi solide (In Vitro Cell. Dev. Bioll. Plant 35 :451-455, 1999), et plus particulièrement de cellules de soja. Pour ces cellules compétentes, le blanchiment in vitro lié à l'inhibition de la synthèse des tocophérols n'est pas létale et ne diminue pas la division cellulaire.

La présente invention concerne plus particulièrement un procédé de préparation d'un soja transgénique comprenant un gène hétérologue intégré dans son génome, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- a1) préparation de tissus embryogéniques prolifératifs par culture d'embryons zygotiques immatures de soja sur un milieu inducteur approprié,
- a2) transfert des tissus embryogéniques prolifératifs dans un milieu de culture approprié,
- a3) blanchiment des tissus embryogéniques prolifératifs par ajout d'une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD au milieu de culture,
- b) transformation des tissus embryogéniques prolifératifs blanchis par bombardement de particules enrobées de fragments d'ADN comprenant le gène hétérologue et le gène de résistance aux inhibiteurs d'HPPD,
- c) croissance et sélection des cellules transformées comprenant le gène hétérologue et le gène de résistance aux inhibiteurs d'HPPD dans un milieu de culture approprié comprenant une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD,
- d) régénérations de plantes à partir des cellules transformées sélectionnées dans un ou plusieurs milieux appropriés,
- e) obtention et récupération de graines de soja transformées fertiles comprenant le gène hétérologue et le gène de résistance aux inhibiteurs d'HPPD.

De manière avantageuse, les inhibiteurs d'HPPD sont choisis parmi les isoxazoles (EP 418 175, EP 470 856, EP 487 352, EP 527 036, EP 560 482, EP 682 659, US 5 424

276) en particulier l'isoxaflutole, herbicide sélectif du maïs, les dicétonitriles (EP 496 630, EP 496 631), en particulier la 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-SO₂ CH₃-4-CF₃ phényl) propane-1,3-dione et la 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-SO₂ CH₃-4-2,3 Cl₂ phényl) propane-1, 3-dione, les tricétones (EP 625 505, EP 625 508, US 5,506,195), en particulier la
 5 sulcotrione ou la mésotrione, ou encore les pyrazolines. De manière préférentielle, l'inhibiteur d'HPPD est choisi parmi les dikétonitriles, en particulier la 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-SO₂ CH₃-4-CF₃ phényl) propane-1,3-dione et la 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-SO₂ CH₃-4-2,3 Cl₂ phényl) propane-1, 3-dione.

La quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD introduite dans le milieu approprié de
 10 préparation et de culture des cellules compétentes selon l'invention dépendra d'une part de l'inhibiteur d'HPPD employé et d'autre part des cellules compétentes employées, de par leur plante d'origine et leur forme. L'homme du métier saura déterminer cette quantité appropriée par des techniques usuelles de croissance des cellules compétentes à différentes concentrations de l'inhibiteur d'HPPD employé.

15 De manière préférentielle, la concentration en inhibiteurs d'HPPD est comprise entre 0,5 et 50 mg de matière active par litre de milieu, plus préférentiellement comprise entre 1 et 10 mg/l.

De manière avantageuse, l'inhibiteur d'HPPD est appliqué aux cellules végétales compétentes dans le milieu de culture entre 1 mois et 1 semaines, avant l'étape de
 20 transformation, préférentiellement entre 15 et 10 jours. L'homme du métier saura déterminer le moment d'application de l'inhibiteur d'HPPD avant la transformation en fonction des tissus à transformer et de l'inhibiteur d'HPPD et de sa concentration, et de la cinétique de blanchiment des tissus. Il est commun aux techniques de transformation de cellules végétales que les cellules végétales compétentes doivent être repiquées de manière
 25 régulière dans des milieux de culture frais. Le temps entre chaque opération de repiquage dépendra en particulier du milieu de culture et de la vitesse de croissance des cellules végétales. Il est généralement de 10 à 15 jours. De manière avantageuse, l'inhibiteur d'HPPD sera introduit dans le milieu de culture frais avant de procéder au repiquage des cellules, généralement au cours du dernier repiquage précédant l'étape de transformation.

30 Les milieux appropriés pour la préparation et la culture des cellules végétales compétentes comme les milieux appropriés pour la croissance et la sélection des cellules transformées et les milieux pour la régénération des plantes transformées sont des milieux usuels bien connus de l'homme du métier et largement décrits dans la littérature et notamment dans les références citées dans la présente demande de brevet.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, le milieu approprié pour la préparation et la culture des cellules végétales compétentes et le milieu approprié pour la croissance et la sélection des cellules transformées sont identiques et comprennent la même concentration en inhibiteur d'HPPD. Selon un autre mode de réalisation de l'invention, ils ne diffèrent que de par leur concentration en inhibiteur d'HPPD, le premier milieu comprenant une concentration en inhibiteur supérieure au second ou l'inverse. Selon un autre mode de réalisation de l'invention, les milieux diffèrent de par leur composition en éléments nutritifs et hormones nécessaire à la croissance des cellules compétentes avant et après transformation. De manière préférentielle, les deux milieux sont identiques de par leur composition en éléments nutritifs et hormones et leur concentration en inhibiteurs d'HPPD.

Selon un premier mode de réalisation de l'invention, le milieu approprié pour la préparation et la culture des cellule compétentes et/ou le milieu approprié pour la croissance et la sélection des cellules transformées est un milieu D20 décrit Santarém et Finer (In Vitro Cell. Dev. Biol.-Plant 35 : 451-455, 1999), au quel on ajoute une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD.

Selon un deuxième mode de réalisation de l'invention, le milieu approprié pour la préparation et la culture des cellule compétentes et/ou le milieu approprié pour la croissance et la sélection des cellules transformées est un milieu FNL décrit par Samoylov & coll. (Plant Cell. Rep., 18 :49-54, 1998), dont la composition détaillée est donnée dans les exemples ci-après, auquel on ajoute une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD. De manière préférentielle, les deux milieux sont des milieux FNL.

Le milieu inducteur approprié est de préférence un milieu D40 tel que défini dans les exemples.

Le milieu de régénération approprié est de préférence un milieu SBP6 décrit par Finer & Nagasawa (Plant Cell. Tissue and Organ Culture 15 : 125-136, 1988) défini dans les exemples ci-après pour la croissance des tissus, puis un milieu tel que décrit par Finner & McMullen (In Vitro Cell. Dev. Biol. 27P :175-182, 1991) pour la conversion des tissus en embryons, puis un milieu MS, en particulier un milieu MS tel que décrit dans les exemples pour la germination des embryons.

Il est entendu dans de qui précède et ce qui suit que lorsque le gène hétérologue que l'on souhaite introduire dans la plante est un gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD, seul le gène de résistance aux inhibiteurs d'HPPD est introduit dans les cellules végétales.

Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention, l'étape de transformation des cellules compétentes (étape b) est effectuée par la méthode de bombardement de particules, étant entendu que d'autres méthodes équivalentes de transfert d'ADN nu comme l'agitation des cellules compétentes en présence d'ADN et de fibres de silices (Whiskers) peuvent être employées. Le principe de la transformation par bombardement de particules est bien connu de l'homme du métier et largement décrit dans la littérature pour différentes espèces de cellules végétales et de plantes. Pour la transformation des plantes dicotylédones, et du soja en particulier, on citera notamment les références suivantes : Finer & coll. (Plant Cell. Rep. 11 :323-328, 1992). La transformation par bombardement de particules consiste essentiellement à agréger des fragments d'ADN comprenant les gènes à transférer sur des particules métalliques qui sont ensuite bombardées sur les cellules végétales compétentes au moyen de canons à particules. Les particules comme les appareils permettant le bombardement des cellules compétentes sont bien connus de l'homme du métier, décrits dans la littérature et disponibles dans le commerce. On citera notamment les brevets et demandes de brevet US 4 945 050, EP 270 356, US 5 204 253, EP 434 616, US 5 516 670, EP 535 005 ou US 5 466 587. Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention, les particules métalliques sont des particules fonctionnalisées par le greffage de silicones aminées telles que décrites dans le brevet US 6 068 980.

De manière préférentielle, les gènes de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comprennent dans le sens de la transcription une séquence de régulation promotrice fonctionnelle dans les cellules végétales et les plantes, liée de manière fonctionnelle à une séquence d'ADN codant pour une HPPD liée de manière fonctionnelle à une séquence de régulation terminatrice fonctionnelle dans les cellules végétales et les plantes. Les séquences codant pour des HPPD sont des séquences d'HPPD natives, notamment de plantes, de microorganismes, de champignons ou de mammifères, notamment les séquences décrites dans les demandes de brevet WO 96/38567, US 6 087 563, WO 97/49816 ou WO 99/24585. Il s'agit notamment de séquences codant pour des HPPD de *Pseudomonas fluorescens*, d'*Arabidopsis thaliana*, de carotte, de blé, de *Synechocystis*. Les séquences codant pour des HPPD sont également des séquences mutées dans leur partie C-terminale telles que décrites dans la demande de brevet WO 99/24585 ou des HPPD chimères telles que décrites dans la demande de brevet WO 99/24586. Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention, la séquence d'ADN codant pour une HPPD est une séquence d'HPPD mutée dans sa partie terminale, plus particulièrement une séquence comprenant la mutation W336 telle que décrite dans la demande de brevet WO 99/24585,

plus préférentiellement la séquence d'HPPD de *Pseudomonas fluorescens* comprenant la mutation W336 telle que décrite dans la demande de brevet WO 99/24585.

Selon un mode préférentiel de réalisation de l'invention, le gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comprend dans le sens de la transcription une séquence de régulation promotrice sélectionnée parmi le promoteur de la petite sous unité de la RuBisCo de tournesol, décrit dans la demande de brevet WO 99/25842, ou le promoteur d'histone d'*Arabidopsis thaliana* combiné à l'enhancer du virus etch du tabac (TEV) te que décrit dans la demande de brevet WO 99/24585, liée de manière fonctionnelle à une séquence d'ADN codant pour une peptide de transit, de préférence un peptide de transit optimisé, tels que définis ci-après, liée de manière fonctionnelle à une séquence d'ADN codant pour une HPPD telle que définie ci-dessus, de préférence une séquence codant pour une HPPD de *Pseudomonas fluorescens* comprenant la mutation W336, liée de manière fonctionnelle à une séquence de régulation terminatrice, en particulier la séquence terminatrice NOS définie ci-après. Les gènes de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD correspondants sont représentés dans les figures en annexe par les cartes de plasmides pCH73 et pCH94, et par leurs séquences nucléotidiques :

pCH73 : SEQ ID NO 1, représentation 3'-5'

Promoteur : 4541-5257

Peptide de transit optimisé : 4130-4487

HPPDW336 : 3045-4119

NOS : 2749-3000

PCH94 : SEQ ID NO 2

Promoteur : 34-1272

TEV enhancer : 1292-1421

Peptide de transit optimisé : 1428-1793

HPPDW336 : 1795-2869

NOS : 2914-3165

De manière préférentielle, les gènes hétérologues codant pour une protéine d'intérêt comprennent dans le sens de la transcription une séquence de régulation promotrice fonctionnelle dans les cellules végétales et les plantes, liée de manière fonctionnelle à une séquence d'ADN codant pour une protéine ou un peptide d'intérêt liée de manière fonctionnelle à une séquence de régulation terminatrice fonctionnelle dans les cellules végétales et les plantes.

Les séquences d'ADN codant pour une protéine ou un peptide d'intérêt sont généralement des séquences codant pour des protéines ou des peptides conférant à la plante transformée de nouvelles propriétés agronomiques, ou d'amélioration de la qualité agronomique de la plante transformée.

5 Parmi les gènes conférant de nouvelles propriétés agronomiques aux plantes transformées, on peut citer les séquences d'ADN codant pour des protéines conférant une tolérance à certains herbicides, ceux conférant une résistance à certains insectes, ceux conférant une tolérance à certaines maladies, etc. De tels gènes sont notamment décrits dans les demandes de brevet WO 91/02071 et WO 95/06128.

10 Parmi les séquences d'ADN codant pour des protéines conférant une tolérance à certains herbicides aux cellules végétales et aux plantes transformées., on peut citer le gène Bar conférant une tolérance au bialaphos, le gène codant pour une EPSPS appropriée conférant une résistance aux herbicides ayant l'EPSPS comme cible comme le glyphosate et ses sels (US 4,535,060, US 4,769,061, US 5,094,945, US 4,940,835, US 5,188,642, US
15 4,971,908, US 5,145,783, US 5,310,667, US 5,312,910, US 5,627,061, US 5,633,435, FR 2 736 926), le gène codant pour la glyphosate oxydoréductase (US 5,463,175), ou encore un gène codant pour une HPPD conférant une tolérance aux herbicides ayant pour cible l'HPPD cités précédemment comme les isoxazoles, notamment l'isoxafutole (FR 95 06800, FR 95 13570), les dicétonitriles (EP 496 630, EP 496 631) ou les tricétones,
20 notamment la sulcotrione ou la mésotrione (EP 625 505, EP 625 508, US 5,506,195).

Parmi les séquences d'ADN codant pour une EPSPS appropriée conférant une résistance aux herbicides ayant l'EPSPS comme cible, on citera plus particulièrement le gène codant pour une EPSPS végétale, en particulier de maïs, présentant deux mutations 102 et 106, décrit dans la demande de brevet FR 2 736 926, dénommé ci-dessous EPSPS
25 double mutant, ou encore le gène codant pour une EPSPS isolée d'*Agrobacterium* décrit par les séquences ID 2 et ID 3 du brevet US 5,633,435, dénommé ci-dessous CP4.

Dans les cas des séquences d'ADN codant pour EPSPS ou HPPD, et plus particulièrement pour les gènes ci-dessus, la séquence codant pour ces enzymes est avantageusement précédée par une séquence codant pour un peptide de transit, en
30 particulier pour le peptide de transit dit peptide de transit optimisé décrit dans les brevets US 5,510,471 ou US 5,633,448.

Parmi les séquences d'ADN codant pour des protéines d'intérêt conférant de nouvelles propriétés de résistance aux insectes, on citera plus particulièrement les protéines Bt largement décrites dans la littérature et bien connues de l'homme du métier. On citera

aussi les protéines extraites de bactéries comme *Photobacterium* (WO 97/17432 & WO 98/08932).

Parmi les séquences d'ADN codant pour des protéines ou peptides d'intérêt conférant de nouvelles propriétés de résistance aux maladies on citera notamment les chitinases, les glucanases, l'oxalate oxydase, toutes ces protéines et leurs séquences
 5 codantes étant largement décrites dans la littérature, ou encore les peptides antibactériens et/ou antifongiques, en particulier les peptides de moins de 100 acides aminés riches en cystéines comme les thionines ou défensines de plantes, et plus particulièrement les peptides lytiques de toutes origines comprenant un ou plusieurs ponts disulfures entre les
 10 cystéines et des régions comprenant des acides aminés basiques, notamment les peptides lytiques suivants : l'androctonine (WO 97/30082 et WO 99/09189), la drosomicine (WO 99/02717), la thanatine (WO 99/24594) ou l'héliomicine (WO 99/53053). Selon un mode particulier de réalisation de l'invention, la protéine ou peptide d'intérêt est choisi parmi les peptides éliciteurs fongiques, en particulier les élicitines (Kamoun & al., 1993 ; Panabières
 15 & al., 1995).

Parmi les séquences d'ADN codant pour des protéines ou peptides modifiant la constitution des plantes modifiées, on peut citer en particulier les séquences d'ADN codant pour des protéines ou peptides modifiant en particulier la teneur et la qualité de certains acides gras essentiels (EP 666 918) ou encore la teneur et la qualité des protéines, en
 20 particuliers dans les feuilles et/ou les graines desdites plantes. On citera en particulier les gènes codant pour des protéines enrichies en acides aminés soufrés (Korit, A.A. & al., Eur. J. Biochem. (1991) 195, 329-334 ; WO 98/20133 ; WO 97/41239 ; WO 95/31554 ; WO 94/20828 ; WO 92/14822). Ces protéines enrichies en acides aminés soufrés auront également pour fonction de piéger et stocker la cystéine et/ou la méthionine excédentaire,
 25 permettant d'éviter les problèmes éventuels de toxicité liés à une surproduction de ces acides aminés soufrés en les piégeant. On peut citer également des gènes codant pour des peptides riches en acides aminés soufrés et plus particulièrement en cystéines, les dits peptides ayant également une activité antibactérienne et/ou antifongique. On citera plus particulièrement les défensines de plantes, de même que les peptides lytiques de toute
 30 origine, et plus particulièrement les peptides lytiques décrits précédemment. On citera également les protéines SAT décrites dans les demandes de brevet WO 00/36127, WO 00/04167 et WO 00/01833.

Comme séquence de régulation promotrice dans les cellules végétales et les plantes, on peut utiliser toute séquence promotrice d'un gène s'exprimant naturellement dans les

plantes en particulier un promoteur s'exprimant notamment dans les feuilles des plantes, comme par exemple des promoteurs dits constitutifs d'origine bactérienne, virale ou végétale ou encore des promoteurs dits lumière dépendants comme celui d'un gène de la petite sous-unité de ribulose- biscoxylase/oxygénase (RuBisCO) de plante ou tout

5 promoteur convenable connu pouvant être utilisé. Parmi les promoteurs d'origine végétale on citera les promoteurs d'histone tels que décrits dans la demande EP 0 507 698, ou le promoteur d'actine de riz (US 5,641,876). Parmi les promoteurs d'un gène de virus de plante, on citera celui de la mosaïque du choux fleur (CAMV 19S ou 35S), ou le promoteur du circovirus (AU 689 311).

10 On peut encore utiliser une séquence de régulation promotrice spécifique de régions ou de tissus particuliers des plantes, et plus particulièrement des promoteurs spécifiques des graines ([22] Datla, R.& al., Biotechnology Ann. Rev. (1997) 3, 269-296), notamment les promoteurs de la napine (EP 255 378), de la phaseoline, de la glutenine, de l'héliantinine (WO 92/17580), de l'albumine (WO 98/45460), de l'oélosine (WO

15 98/45461), de l'ATS1 ou de l'ATS3 (PCT/US98/06978, déposée le 20 octobre 1998, incorporée ici par référence).

On peut également employer un promoteur inductible avantageusement choisi parmi les promoteurs de phénylalanine ammoniac lyase (PAL), d'HMG-CoA reductase (HMG), de chitinasés, de glucanases, d'inhibiteurs de protéinase (PI), de gènes de la famille PR1,

20 de la nopaline synthase (nos) ou du gène vspB (US 5 670 349, Tableau 3), le promoteur HMG2 (US 5 670 349), le promoteur de la beta-galactosidase (ABG1) de pomme ou le promoteur de l'acétyl coenzyme A carboxylase synthase (ACC synthase) de pomme (WO 98/45445).

Selon l'invention, on peut également utiliser, en association avec le promoteur la

25 séquence de régulation promotrice, d'autres séquences de régulation, qui sont situées entre le promoteur et la séquence codante, telles que des activateurs de transcription ("enhancer"), comme par exemple l'activateur de translation du virus de la mosaïque du tabac (VMT) décrit dans la demande WO 87/07644, ou du virus etch du tabac (VET) décrit par Carrington & Freed, ou des introns comme l'intron adh1 de maïs ou l'intron 1 d'actine

30 de riz.

Comme séquence de régulation terminatrice ou de polyadénylation, on peut utiliser toute séquence correspondante d'origine bactérienne, comme par exemple le terminateur nos d'*Agrobacterium tumefaciens*, d'origine virale, comme par exemple le terminateur du

CaMV 35S, ou encore d'origine végétale, comme par exemple un terminateur d'histone tel que décrit dans la demande EP 0 633 317.

Les séquences codant pour une HPPD comme les séquences codant pour une protéine ou un peptide d'intérêt peuvent comprendre, liés de manière fonctionnelle en 5' ou en 3' des séquences codant pour des signaux d'adressage dans différents compartiments de la cellule végétale, comme les chloroplastes, les mitochondries, la vacuole. De tels signaux sont décrits dans la littérature et bien connus de l'homme du métier. Les peptide de transit chroloplastiques peuvent être simples, comme un peptide de transit d'EPSPS (US 5,188,642) ou un peptide de transit de celui de la petite sous-unité de ribulose-biscarboxylase/oxygénase (ssu RuBisCO) d'une plante, éventuellement comprenant quelques acides aminés de la partie N-terminale de la ssu RuBisCO mature (EP 189 707) ou encore un peptide de transit multiple comprenant un premier peptide de transit de plante fusionné à une partie de la séquence N-terminale d'une protéine mature à localisation plastidiale, fusionnée à un deuxième peptide de transit de plante tel que décrit dans le brevet EP 508 909, et plus particulièrement le peptide de transit optimisé comprenant un peptide de transit de la ssu RuBisCO de tournesol fusionné à 22 acides aminés de l'extrémité N-terminale de la ssu RuBisCO de maïs fusionnée au peptide de transit de la ssu RuBisCO de maïs tel que décrit avec sa séquence codante dans le brevet EP 508 909.

Les exemples ci-après permettent d'illustrer l'invention pour la transformation du soja, sans toutefois chercher à en limiter la portée.

Toutes les méthodes ou opérations décrites ci-dessous dans ces exemples sont données à titre d'exemples et correspondent à un choix, effectué parmi les différentes méthodes disponibles pour parvenir au même résultat. La plupart des méthodes d'ingénierie des fragments d'ADN sont décrites dans "Current Protocols in Molecular Biology" Volumes 1 et 2, Ausubel F.M. et al, publiés par Greene Publishing Associates et Wiley -Interscience (1989) ou dans Molecular cloning, T.Maniatis, E.F.Fritsch, J.Sambrook, 1982.

Le contenu de toutes les références citées dans la description ci-dessus et dans les exemples ci-après est incorporé au contenu de la présente demande de brevet par référence.

Exemple 1 : Technologie de transformation du soja

La technologie employée pour la transformation du soja a été décrite par Santarém & Finer: Transformation of soybean (Glycine max (L.) Merrill) using proliferative embryogenic tissue maintained on semi-solid medium. In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant 35 : 451-455, 1999. Elle comprend les étapes ci-après.

Des embryons immatures zygotiques (de 3 à 4 mm) sont disséqués de manière aseptisée et placés le côté adaxial sur le dessus dans un milieu comprenant du 2,4D (D40).

D 40 est un milieu Murashige and Skoog décrit dans : Murashige & Skoog: A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. *Physiol. Plant.* 15 : 473-497; 1962. (mg/l) : NH_4NO_3 : 1650, H_3BO_3 : 6,2; CaCl_2 , $2\text{H}_2\text{O}$: 332,2; CoCl_2 , $6\text{H}_2\text{O}$: 0,025; CuSO_4 , $5\text{H}_2\text{O}$: 0,025; Na_2EDTA : 37,26; FeSO_4 , $7\text{H}_2\text{O}$: 27,8; MnSO_4 , $7\text{H}_2\text{O}$: 16,9; Na_2MoO_4 , $2\text{H}_2\text{O}$: 0,25; KI : 0,83; KNO_3 : 1900; KH_2PO_4 : 170; ZnSO_4 , $7\text{H}_2\text{O}$: 8,6 avec de la vitamine B5 Gamborg décrite par : Gamborg, Miller and Ojima: Nutrient requirements of suspension cultures of soybean root cells. *Exp. Cell Res.* 50 : 151-158, 1968 : (mg/l) : myo-inositol: 100; Nicotinic acid: 1; Pyridoxine-Hcl: 1; Thiamine-Hcl: 10; and 40 mg/l of 2,4-D and 6% sucrose; 0,3% gelrite, pH 7,0.

Après 3 semaines de culture en milieu D40, les cotylédons sont transférés sur un milieu D20 qui comprend essentiellement les même éléments que le milieu D40, à l'exception de la concentration en 2,4D qui est abaissée à 20 mg/l et de la concentration en saccharose qui est abaissée de 60 g/l à 30 g/l, à pH 5,7.

Sur ce milieu, les embryons somatiques commencent à proliférer sous forme de d'agrégats compacts, ou « clumps ». Les « clumps » embryogéniques sont ensuite transférés tous les 15 jours sur un nouveau milieu D 20 pour augmenter la production de tissus. Cinq ou six transferts (environ 3 mois) sur ce milieu sont nécessaires pour optimiser leur compétence à la transformation. L'emploi de tissus embryogéniques à un stade plus précoce conduit à des résultats beaucoup plus faibles.

Transformation des tissus

Le bombardement de particules est employé pour la transformation des tissus embryogéniques.

Préparation des particules: Des particules de tungstène fonctionnalisées (M17) sont préparées selon le brevet US 6 068 980. Les particules sont fonctionnalisées par greffage de silicones aminées comme élément de vectorisation et lavées dans l'éthanol absolu. 2,5 mg de particules dans l'éthanol sont mélangés avec 3 μg d'ADN. Après précipitation ; les particules sont pipetées et employées pour deux tirs avec un canon à particules de type PIG décrit par Finer, Vain, Lones and McMullen dans : Development of the Particle Inflow Gun for DNA delivery to plant cells. *Plant Cell Rep.* 11 : 323-328, 1992.

Avant le bombardement, les tissus sont séchés sous vide sous une hotte laminaire pendant 5 à 10 mn, puis placés entre deux écrans de 500 μm puis bombardés deux fois.

Après le bombardement, les tissus sont transférés deux fois sur milieu D20 (2x10 jours) avant de débiter la sélection par l'hygromycine (30 mg/l).

De manière à éviter la manipulation de tissus et de gagner du temps, les cals bombardés sont placés sur un écran de gaze stérile fixé par deux anneaux métalliques (figure 2) qui permettent un contact direct entre les tissus embryogéniques et le milieu solide. Les écrans de gaze sont transférés sur des milieux frais chaque 15 jours jusqu'à ce que des cals verts soient observés. Il est entendu que le principe de transfert de cals décrit ci-dessus n'est pas limité aux cals de soja et à la sélection par l'hygromycine, mais peut être employé pour tout procédé de culture de tissus et de suspensions cellulaires nécessitant un changement fréquent de milieu de culture.

Amplification et Régénération des tissus

Les cals verts qui poussent sur milieu comprenant de l'hygromycine sont amplifiés pendant 1 mois sur milieu SBP6 décrit par Finer & Nagasawa dans : Development of an embryogenic suspension culture of soybean (Glycine max Merrill.) Plant Cell. Tissue and Organ Culture 15 : 125-136, 1988 (mg/l) : Na₂EDTA: 37,24; FeSO₄, 7H₂O: 27,84; MgSO₄, 7H₂O: 370; MnSO₄, H₂O: 16,9; ZnSO₄, H₂O: 8,6; CuSO₄, 7H₂O: 0,025; CaCl₂, 2H₂O: 440; KI: 0,83; CoCl₂, 6H₂O: 0,025; KH₂PO₄: 170; H₃BO₃: 6,2; Na₂MoO₄, 2H₂O: 0,25; myo-inositol: 100; nicotinic acid: 1; pyridoxine-HCL: 1; thiamine-HCL: 10; NH₄NO₃: 800; KNO₃: 3000; asparagine: 670; 6% sucrose; 2,4-D: 5, pH 5,7.

Lorsque suffisamment de tissus sont produits, ils sont ensuite convertis en embryons en employant un milieu décrit par Finer & McMullen dans : Transformation of soybean via particle bombardment of embryogenic suspension culture tissue. In Vitro Cell. Dev.Biol. 27P : 175-182, 1991.

Après 3-4 transferts sur ce milieu, les embryons sont séchés à l'air dans une boîte de Petri pendant 2 jours avant germination sur un milieu Murashige & Skoog (vitamines B5) à demi force avec 15 g/l de saccharose, 7g/l de phytagar, pH 5,7.

Lorsque les plantes sont bien développées, elles sont transférées dans un substrat à base de tourbe "jiffy pot" pour une période de 10 jours pour acclimatation avant d'être transférées en serre.

Cette technologie employant l'écran de gaze et la sélection par l'hygromycine permet de régénérer 200 cals par personne et par an.

Exemple 2 : Transformation des tissus selon l'invention

Le même procédé de sélection a été développé pour les inhibiteurs d'HPPD avec un milieu D20 comprenant 2 mg/l d'isoxaflutole ou 0,5 à 5 mg/l de dikétonitriles. Le gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD employé comme marqueur de sélection est le pCH73 ou le pCH94 représentés sur la figure 1.

5 10 à 15 jours précédant le bombardement, on introduit dans le milieu D20 l'isoxaflutole ou les dikétonitriles aux concentrations précitées de manière à blanchir les tissus. Après bombardement, les tissus sont placés directement dans le même milieu D20 comprenant 2mg/l d'isoxaflutole ou de dikétonitrile (entre 0,5 to 5 mg/l) et transférés dans un milieu frais tous les 15 jours. Après 4 transferts sur l'isoxaflutole, des cals verts sont
10 identifiés et amplifiés comme décrit dans l'exemple 1. Le temps nécessaire à l'obtention de cals de cellules compétentes pour le bombardement est de 3 mois et demi. La sélection des cellules transformées (cals verts) intervient environ 6 mois suivant l'initiation des cals pour la transformation (figure 3).

Lorsque les tissus sont transférés pour sélection sur l'isoxaflutole, ils sont rapidement
15 blanchis par l'herbicide, sans observer d'inhibition de la croissance. Ceci est dû au fait que l'absence de caroténoïdes, de chlorophylle et de tocophérols n'est pas indispensable à la croissance des tissus.

Les résultats obtenus avec et sans blanchiment préalable sont représentés dans le Tableau 1 ci-après.

20

Tableau 1 : transformation sur milieu D20

Blanchiment	PCH73			PCH94		
	1	2	3	1	2	3
Essai	1	2	3	1	2	3
Avant Bombardement	0	0,5	0,25	0,67	1	2
Après Bombardement	0	0	0,25	0,67	0,33	0,25

Ils montrent, en particulier pour le pCH94 un plus grand nombre de cals identifiés en amorçant la sélection avant le bombardement selon l'invention. Ce plus grand nombre de
25 cals sélectionnés est lié à l'amélioration du processus de sélection selon l'invention, en facilitant l'identification des cals transformés.

Exemple 3 : Choix du milieu

De manière à améliorer le processus de sélection selon l'invention, on a cherché à
30 diminuer le nombre de transfert de tissus et le temps nécessaire à l'obtention de cals de

cellules compétentes et de cals verts sélectionnés après bombardement. A cet effet, le milieu D20 employé précédemment a été remplacé par un milieu FNL modifié, lequel permet une prolifération rapide des tissus.

- Le milieu FNL a été décrit par Samoylov, Tucker, Thibaud-Nissen & Parrott dans :
- 5 A liquid-medium-based protocol for rapid regeneration from embryogenic soybean cultures: Plant Cell Rep, 18 : 49-54, 1998.

Ce milieu permet d'obtenir plus rapidement des tissus prêts au bombardement, une plus grande embryogénie et des cycles de transfert plus courts.

- Composition du milieu FNL (mg/l): Na2EDTA: 37,24; FeSO4, 7H2O: 27,84; 10 MgSO4, 7H2O: 370; MnSO4, H2O: 16,9; ZnSO4, H2O: 8,6; CuSO4, 7H2O: 0,025; CaCl2, 2H2O: 440; KI: 0,83; CoCl2, 6H2O: 0,025; KH2PO4: 170; H3BO3: 6,2; Na2MoO4, 2H2O: 0,25; myo-inositol: 100; nicotinic acid: 1; pyridoxine-HCL: 1; thiamine-HCL: 10; (NH4)2SO4: 460; KNO3: 2820; asparagine: 670; 1% sucrose; 2,4-D: 10; 0,3% gelrite; pH 5,7.

- 15 Toutefois, en l'absence de blanchiment préalable, la quantité de tissus à manipuler pendant le processus de sélection reste trop importante, comparable à celle du milieu D20 du fait de la vitesse importante de leur développement.

- Le bombardement de tissus blanchis par l'isoxaflutole selon l'invention ne nécessite qu'un seul transfert de cals avant d'obtenir les cals verts sélectionnés, contre 4 en 20 employant le milieu D20.

Le temps nécessaire à l'obtention de cals de cellule compétentes pour le bombardement est de 2 mois, les cals transformés verts étant sélectionnés environ 3 mois suivant l'initiation des cals pour la transformation (figure 3).

- Les résultats de transformation avec les plasmides pCH73 et pCH94 sont reportés sur 25 le tableau 2 ci-après.

Tableau 2 : Transformation sur milieu FNL

Blanchiment	pCH73			PCH94			
	1	2	3	1	2	3	4
Essai	1	2	3	1	2	3	4
Avant Bombardement	1	1,5	0,33	1	1	0,33	1,5
Après Bombardement	0,25	0	-	-	-	-	-

- . Le nombre moyen de cals verts sélectionnés par essai de transformation en employant les tissus blanchis selon l'invention est de 1 par tir. Ce tableau montre 30 également qu'avec le blanchiment préalables des tissus, on obtient les même fréquences de

transformation pour les deux gènes pCH73 et pCH94, alors que le promoteur ssu RuBisCo de pCH73 est connu pour avoir une expression faibles dans les cals in vitro, contrairement au promoteur d'histone de pCH94.

- 5 L'emploi du milieu FNL en combinaison avec le blanchiment préalable des tissus selon l'invention permet de diminuer de manière substantielle le temps nécessaire à la sélection des cals verts et la charge de travail pour tout le processus de transformation des plantes.

Revendications

1. Procédé de transformation de cellules végétales par l'introduction d'un gène hétérologue dans lesdites cellules végétales avec un gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comme marqueur de sélection, ledit procédé comprenant les étapes de
 - a) préparation et culture de cellules végétales compétentes aptes à recevoir le gène hétérologue dans un milieu approprié,
 - b) transformation des cellules compétentes avec le gène hétérologue et le marqueur de sélection,
 - 10 c) croissance et sélection des cellules transformées comprenant le gène hétérologue dans un milieu approprié.

caractérisé en ce que l'on effectue une étape de blanchiment des cellules végétales compétentes avant l'étape de transformation (b), en introduisant dans le milieu approprié de culture des cellules végétales compétentes une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD.

- 15 2. Procédé de préparation de plantes transgéniques, comprenant un gène hétérologue intégré dans son génome, comprenant un procédé de transformation de cellules végétales selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il consiste ensuite à effectuer les étapes suivantes de :
 - d) régénération de plantes à partir des cellules transformées sélectionnées dans un ou
 - 20 plusieurs milieux appropriés, et le cas échéant,
 - e) obtention et récupération des graines des plantes transformées fertiles.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que les plantes transgéniques obtenues par le procédé selon l'invention sont des plantes transgéniques fertiles.

- 25 4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les cellules végétales sont choisies parmi les cellules de plantes dicotylédones, notamment le tabac, le colza, la betterave à sucre, les pommes de terre, le coton, ou le soja.

5. procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce que les cellules végétales sont des cellules de soja.

- 30 6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que les cellules végétales compétentes sont choisies parmi les cals embryogéniques, les cultures cellulaires sur support solide ou en suspension, ou les tissus embryogéniques.

7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que les cellules végétales compétentes sont des tissus embryogéniques proliférants.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce que les tissus embryogéniques proliférants sont maintenus dans un milieu semi solide.

9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que le milieu semi solide est un milieu FNL.

5 10. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que l'inhibiteur d'HPPD est choisis parmi les isoxazoles, en particulier l'isoxaflutole, les dicétonitriles, en particulier la 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-SO₂ CH₃-4-CF₃ phényl) propane-1,3-dione et la 2-cyano-3-cyclopropyl-1-(2-SO₂ CH₃-4-2,3 Cl₂ phényl) propane-1, 3-dione, les tricétones, en particulier la sulcotrione ou la mésotrione, ou les
10 pyrazolines.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce que la concentration en inhibiteurs d'HPPD est comprise entre 0.5 mg/l et 50 mg/l, plus préférentiellement comprise entre 1 mg/l et mg/l.

12. Procédé de préparation de plantes transgéniques, comprenant un gène
15 hétérologue intégré dans leur génome, lequel procédé comprend un procédé de transformation de cellules végétales par l'introduction d'un gène hétérologue dans lesdites cellules végétales avec un gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comme marqueur de sélection, ledit procédé comprenant les étapes de

- a) préparation et culture de cellules végétales compétentes aptes à recevoir le gène
20 hétérologue dans un milieu approprié,
- b) transformation des cellules compétentes avec le gène hétérologue et le marqueur de sélection,
- c) croissance et sélection des cellules transformées comprenant le gène hétérologue dans un milieu approprié.
- 25 d) régénération de plantes à partir des cellules transformées sélectionnées dans un ou plusieurs milieux appropriés, et le cas échéant,
- e) obtention et récupération des graines des plantes transformées fertiles, puis

obtention de nouvelles variétés de plantes transgéniques ayant intégré le gène hétérologue de manière stable dans leur génome dans des programmes de sélection
30 classique

caractérisé en ce que l'on effectue une étape de blanchiment des cellules végétales compétentes avant l'étape de transformation (b), en introduisant dans le milieu approprié de culture des cellules végétales compétentes une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD.

13. Procédé selon l'une des revendications 2 à 12, caractérisé en ce que le gène marqueur de sélection est éliminé par croisement des plantes transformées comprenant le gène hétérologue et le gène marqueur de sélection avec une variété non transformée de la même plante.

AVENTIS CROPSCIENCE SA

Utilisation d'inhibiteurs d'HPPD comme agents de sélection dans la transformation de plantes

Abrégé Descriptif :

La présente invention concerne un procédé de transformation de cellules végétales par l'introduction d'un gène hétérologue dans lesdites cellules végétales avec un gène de tolérance aux inhibiteurs d'HPPD comme marqueur de sélection, ledit procédé comprenant les étapes de

- f) préparation et culture de cellules végétales compétentes aptes à recevoir le gène hétérologue dans un milieu approprié,
- g) transformation des cellules compétentes avec le gène hétérologue et le marqueur de sélection,
- h) croissance et sélection des cellules transformées comprenant le gène hétérologue dans un milieu approprié.

caractérisé en ce que l'on effectue une étape de blanchiment des cellules végétales compétentes avant l'étape de transformation (b), en introduisant dans le milieu approprié de culture des cellules végétales compétentes une quantité appropriée d'inhibiteur d'HPPD.

LISTE DE SEQUENCES

<112> Aventis CropScience S.A.

<120> Utilisation d'inhibiteurs d'HPPD comme agents de
sélection dans la transformation des plantes

<141>

<141>

<160> 2

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 5281

<212> ADN

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: gène
chimère

<400> 1

```

ctactgtgcgc caagcgtgat atcatqcatg ttaacatcga tccatgggag cgccttaatt 60
aaatttaaatt cagctgcatt aatgaatcgg ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgat 120
tgggagctct tccgttccct cgtcactga ctgcgtgcgc tgggtcggtc ggctgcggcg 180
agggttatca gctcactcaa aggcggtaat acggttatcc acagaatcag gggataacgc 240
aggaaagaac atgtgagcaa aagggcagca aaaggccagg aaccgtaaaa aggcgcggtt 300
ctcgtgtttt tcccataggg tcccccctcc tgaagagcat cacaaaaatc gaagctcaag 360
tcaaggtggc agaaaaccga caggactata aagataaccag gcgtttccccc ctggaagctc 420
ctcgtgcgc tctctgttcc cgaacctgcc gcttaaccga taactgtccg cctttctccc 480
tccgggaagc gtggcgcttt ctcatagctc acgtgttagg tatctcagtt cgggtgtagg 540
cgttctctcc aagctgggct gtgtgcagca acccccgcgt cagcccgacc gctgcgcctt 600
atcgttaac tatcgttttg agtccaaacc ggtaagacac gaattatcgc caactggcagc 660
tgcacttggc aacaggatta gcagagcag gtatgttaggc ggtgctacag agttcttgaa 720
gtgtgtggtt aactacggct acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa 780
ggaagtacc ttccgaaaaa gagttggtag ctcttgatcc ggcaaaacaa ccaccgctgg 840
taacgttggc ttttttgttt gaaagcagca gattacgcgc agaaaaaag gatctcaaga 900
agctccttgc atcttttcta cgggggtctga cgtcagtgcc aacgaaaact caagtttaagg 960
gatttgggtc atgagattat caaaaaggat ctccacctag atccttttaa attaaaaatg 1020
aagttttaaa tcaatctaaa gtatatatga gtaaaacttg tctgacagtt accaatgctt 1080

```


aatcagtgag gaactatct cagcgatctg tctatttctg tcatccatag ttgcctgaat 1140
cccgctcgtg tagataacta cgatacggga ggccttaacca tctgypccca gtgctgcaat 1150
gatacggca gacccacgct caccggcttc agattttatca gcaataaacc agccagctgg 1160
aaaggccgag ccgagaagtg gtccctcaac tttatccgac tccatccagt ctattlaattg 1170
ttgcgggga gctagagtaa gtatctcgcc acttaatatg ttggggaacg ttgttgcaat 1180
tgctacaggg atcgtgggtg cagctcggc gtttgggtatg gcttattca gctccggctc 1190
ccaaagatca aggcgagtta catgatccc catgttctgc aaaaaagcgg ttagctatct 1200
cggtctccg atcgttctca gaagtaagtt ggcgcagctg ttatcctca tggttatagg 1210
agcacggcat aattctotta ctgtcatgac atccgtaaga tgccttctc tgaacgggca 1220
gtacccaacc aagtcattct gagaatagtg tatgcggcga ccgagttgct ctgcccggg 1230
gttaatacgg gataatacgg ccacacatag cagaacttta aaagtgtca tcaattggaa 1240
acgttcttcg gggcgaaaaa tctcaaggat ctacccgctg ttgagatca gtcagatgta 1250
accactcgt gacccagct gatctccagc atctcttact tccacaggg ttcttgggtg 1260
aaccaaaaa cgaaggccaa atgcgcgaaa aaagggaata aggcgcgccc ggaattgtg 1270
aatatcata ctcttctctt ttaatatia ttgaagcatt tatcagggct attctctcat 1280
gagcggatac atatttgaat gtatttagaa aaataaacc aaaggggttc ccgcacact 1290
tcccggaaaa gtgcacactg aagcgcctg tagcggcga ttaagcggg cgggtgtgtt 1300
ggttaacgcg accgtgacgg ctacactgac cagcgcctca ggcgcgcctc ctttgcctt 1310
ctctcttcc tttctcgaca cgttcgcggg ctctcccgct caagctctaa atcggggat 1320
ccccttaggg ttcgattta gtgcttacc gcaactcagc cccaaaaa ttgattatgg 1330
tgatggttca cgtagtggc catcgccctg atagacgggt tttgcgcctt tgaacttga 1340
gtccacgttc tttaatagt gactcttctt ccaactcga acaacactca accatattc 1350
ggctattct tttgatttat aagggtattt gcgatttctg gctattcgt taaaaaatga 1360
gctgatttaa caaaaattta acgcgaattt taacaaaaa ttaacgccta caatttcat 1370
tcgcattca cgcgcgcga cgtttgggaa ggcacatgg tccgcgcctc ttcttatta 1380
cgcagctgg gcaactgtg ggaaggcga tgggtgcggg cctcttctat attacgcag 1390
ctggcgaaag ggggatgtg tgcgaaggga ttaagttggg taacgcaggg gttttccag 1400
tcacgaactt gtaaaacgac ggcagcgaat ttgcggccgc aattccgat ctagnaatt 1410
agatgacac gcgcgcgata atttatcta ctttgcgcgc tataattctg tttctatgc 1420
gtatcaatg tataattcgc caactctat caaaaaaac catctatca atcaattat 1430
gtatcaatg ttaattata cagtcttca gtaattcaac ngaaattta tgaatttat 1440
cgtacagtg gcaacagat tcaatttca gaaactttat tgcacaaatg ttgaaatg 1450
aggaaattc gtgagtcac cctcggcggg gcttttgac gcttaattgg cgttaattac 1460
accacagac acccggctac gctcgttga ctggaacagc gcttgaagt tccactcgc 1470
aaacccatg tgcgcctgc gctggtgaa ctggaagaac accgggcca tccaggttcc 1480
cgtgaagatc tgcagcaga ggcgttctg gcttccacg gaagatcgt ccagaggtat 1490
atcggtgac tgcagttgat ccaacggctc gcgtggctca ggcaggcgc ctctgagat 1500
ttcgaataa gtgctcggg gcgcggctat gaagcagat ccattttct tcaaggtc 1510
ccaggtctg accaggtgt cgtgagcaa agcacgltg tggatgcctt cgcgttga 1520
ctgacacag aactcttga tctgcgcgc gccttcgac gactctcgt tgaaggtat 1530
ggcgatcag ccgtcgggg caatratggc ctgggaagtc aggcgggtg atcagcctt 1540
gatatcgaag taacgcgctt cagcgaagt gaacaattc tctagaagt tggccagta 1550

gancatggcg ccgcgataga cgttgtgggt caggtggctg atgactttga gacctgcacc 368
 gacgggattg cgtccacac cttcgaggta caggaagtcg atgtcgtaga tcgagctgac 3710
 ttgcacaaa cgttcgatca ggtacaaagg cggcgcgcgc atgcctttga tcgcgggacg 3740
 gttcaatttc atcgcccccg tctcaatatg gacggctgga ggcgcagatt ccaggggcgc 3840
 gctgtatggt ttttcggagt cttcacgcg gaacgcacatg cccacacacg acggggcgtg 3900
 ttggcgga aagtaggagg cgatgctttt gggctcgttg ttgaggatca ggttgatctc 3960
 gctctggcgg tacaggtgca cgttctttga acggtgggtc ggaactttcg tgaagcccat 4020
 gatctcgaag atcggttcca ggtaccgg cgtcggcgac ggaatttga tgaattcaaa 4080
 gcccataagg cccattgggt tttcgtacag atctgcacatg caccggatcc ttcgcgcgtt 4140
 gctgaagttg ccgaggtctt tggaggagcg gggggcgacg gggaggcttg cgttggaact 4200
 ggcgccttgg aacggagcga cggcggtggc cgacggaggc atcatcanyg tgggcgcacat 4260
 tgcacgcgcg ggcaggtacg acagcgtctt gaactctttg ttgccttgg cgggcacac 4320
 ctgcataat tgaactcttc caccgttgcg ggaagggtg gagaagtgt tagcctcttt 4380
 ggcgggtggg aaggcggcgt tggacttaag gccggtgaac ggcgcacac tgttgccctg 4440
 aqcagggcgc gtcggctaa cggtcgcgac tgaggaggag atcgaagcga tggctgcctg 4500
 gctgcctagt atgtatgtac tcgtcgttg cttgggaatt cgatggttga gaatccaatg 4560
 agtgaactta gtgattatga gctgtatata taatacttgt acatgagctg cctgcacac 4620
 aacygataaa aacaaatcta tottaacttg tagtgattct gagcgttaga tgttgtggct 4680
 cttggaattt catgcatagt gtcacacata tataattgca atttgaagac cttatcctat 4740
 aaccacacga aatggagagc cactgttcaa atgcacattg ctcaaaaatct cttatcctat 4800
 cttctaaagg agaggttagc atggaagggt cggagggtga gtgtaatttt tatgaatcat 4860
 gaggttaata gtgtgtggtt tatatttga atgttttaac tatcatgagc gtttgaaaat 4920
 ctgtacagt aattaagtag cagatgtgtt atttttcctc cactcctgt cacttgcct 4980
 ataataaaaa agagtttcaa aaattaccta aaaaccatgt aaattccttg aaactacacg 5040
 aaattctaaa aagaaaatat tgatatcaaa atacgtgaaa actggaccaa tattaccoga 5100
 aactggacca atatgttgta gtgtggttga gcgctatcg ataatgttc tagtctttt 5160
 aatagtaagg ttggaattat taaagcataa ataaaaaca aatacaata caaatttatt 5220
 aagactagaa aaattgtatc atcaagtat tgaattatct agaggatccc cgggggatcc 5280
 a 5381

2110-2

2111-5909

2112-ALN

2113-Sequence artificielle

2210-

2223-Description de la séquence artificielle: gène chimère

2400-2

ggtggcgccc gctctagagc tgcctgcctt gcaggctcag gagaatatg agtcaggcca 21
 tggatacaact aagttccctt gaagtggaca tgatctttga tgcctgagatg attccacagag 120

caagatagtt tgtgttgcaa gtgacacaat tgtaatgaaa caacacacaa aagaatttaa 180
ttgaggcttt gacatgttgt gtgtgtgtgt tgtatttgtg agtgcacgtt ggt atttatt 240
tttggttaag tgatttttaa acctattatg taaatagtta ctttatctat tgaagtgtgt 300
tcgtgtggtc tatagtttct caaaggcaaa ttaaaatggt gacatcctt ttaacattga 360
taatttggtt tacacaaact ttgtaaattt ggtgatattt atggtcctaa gaaatcaata 420
ccatttgtat gttcaaatat caatatcaat acgataactt gataataaa acatgtgatt 480
gttattgttt ttccagtatc aatataaatt aagctactac aaaatttata taattcacta 540
tattataaat ctttttcoggt tgtaacttgt aattcgtggg tttttaaaat aaaagratgt 600
gaaaattttc aaataatgtg atgacgcaat ttatttttcc gagtcccaaa atattccccc 660
ttcattaccc taatttgttg cgcacacatgt aaaacaaaaa acgatttcta gtgtgtatca 720
ctgcacacac ggggacacat aatatgaacc gtgcattaaa acagatcgac ggtttataa 780
tcattttatt gtacacacgg atcgtatgat tgcacatgtt ttccagat caattacat 840
taagtacta caaaatragt ataaatcact atattataaa tcttttgg ttgtacttg 900
taatttggtg gtttttaaa taaaacacatg tgaataattt caaataaagt gatttcgcaa 960
ttttatttcc cagattccaa aatattcccg cttcattacc ctaatttccg gctccacatg 1020
taaaaacaaa gacgattctt agtggcctac actgcacaca cggggatcac taattgaa 1080
cgtcgattaa aacagatcga cggtttatac atcattttat tgcacacacg gatcgatata 1140
traggcgtta gatttaatat gogatcgat tgcacaaaaa atagacatc cgttttgcg 1200
tataaaaaaa attccacatc ttctccccc aatctactc ttaacattc ttctctct 1260
atagacatca attctctcg actctagaat tgcacacaca acatatacaa aacaaaacaa 1320
ttccagcaaa tcaagcatc taattctatt gacgcaattt aaatcattc tttaaaagca 1380
aaagcaattt tctgaaaatt ttccacattt acgaaacata gacatggatt cgtctctc 1440
ctcagtcggg acggttagcc ggacggccc tgcacagcc aacatgttg ctcggctcac 1500
cggcttcaag tccaaacggc ccttccccc caccacagaag cctaaatct tctccccc 1560
tccacacaa cggggaagag ttcaatatat gcaggtgttg cgggcctac gcaacacaaa 1620
gttcagagac cgtcgtcac tgcgcgcgt gtctatgac cccacggga tcatggctc 1680
gtcggccacc ggcgtcgtc cgttcacagg gctcaagtc accgacgac tcccgctgc 1740
ccgcgctac tccagaagcc tgcgcacgt cagcaacggc ggaaggtac ggtgcattg 1800
agatttatc gaaacacaa tggcctgat gggtttcaa ttcatcaat tccgttcgc 1860
cagcctggg acatgggc caatctga cttcatgac ttcaacaaag tccagacaa 1920
tcgttccaaag aacgtgcacc tgcacgcaa cggcgagac aacatgatc tccacaga 1980
gcaacacag atcgcctct aatttgggc cgaacacggc cgttgtgt gggcatgac 2040
gttcgggtg aaggactgc aaaaggtcta caacgggac cgggacttg ggcctagcc 2100
cattcatatt caccacgggc cgtatgaatt caactgggc ggcataaag ccatggcgc 2160
cgttcgttg taccgatcg accgttcgg cgaaggacac tgcattccg acatgcact 2220
cgttatctc caaggtggtg agcgcaatcc ggttggtgca ggtctaaaag tcatgacaa 2280
ctcgcacac aacgtctatc ggggcgcct ggtctactgg gcaattctc atgaaatct 2340
gttaacatc cgtgaagggc gttatttga tatcaagggc gattacacg gctgaatc 2400
caagccatg agtgcgtgg accgatgat ccgatcccg ctgaaggaag acatgacaa 2460
gggtcgggg cagatgaag agttcctgat gcagttcaac gggaaggca ttagcactg 2520
cgcgtctct accgacgac tgcacagac cgggacggc ttgaagaaaa tggcctgac 2580
ttcatgacc ggcgggcag acatttatta cgaatgctc gaaggcggc tgcctgacca 2640

cgggagagcgg gtggatcaac tgcaggcaag cggatcccg ctggacggat cttcngtgga 2700
aggagacaaa cgcctgctgc tgcagatctt ctgggaaacc ctjatgggac cgggtttctt 2760
cgaattccac cagcgcaagg ggcagcatgg gtttggcgag tggaaacttca aggcgtgttt 2820
cgaatccac gaacgtgacc aggtcgctcg tgtgtattg acgcgcgall aagcgtcaaa 2880
aagcccgccc gagggtagct cgaagiatct ccccgatcgt tcaaacctt ggcaataaag 2940
tttcttaaga ttgaatcccg ttgcgcctct tggatgatt atcatataat ttctgtgaa 3000
ttangttaag catgtaataa ttaacatgta atgcctgaag ttatttata gatggcttt 3060
tatgtattga gtcccgcaat tatacattta atagcgata gaaaaaaaa tatagcgccc 3120
aaactaggat aaattatcgc gcgcggcttc atctatgta ctagatcgg aattgcggcc 3180
gcaatccact ggccgtcgtt ttacacgctc gtagctggga aaacccctgc gttacccaac 3240
ttaatcgct tgcagacacat cccctcttcg ccagcagct gcattaatga atcgcccaac 3300
gcgcgaggag aggcggtttg cgtattggg gctctccgc tctctcgtc actgactcgc 3360
tgctctcgt cgttcggctg cggcgagcgg taccagctca ctcaaaagg gtaatacgtt 3420
tatoracaga atcaggggat aaccagggaa aaacatgct agcaaaagg caacaaagg 3480
ccaggaaccc taaaaaggcc gcttgctgg ctttttcca taggcctcgc cccctgaac 3540
agratcaaa aaatcgagc tcaagtcaga ggtggcgaaa ccgaacagga ctataaagat 3600
acnaggcgt tccccctgga agctccctcg tgcctctcc tgttcgacc ctgcgcctta 3660
ccgatacct gtccgccttt ctccttcgg gaagcgtgc gctttctat agctcagct 3720
gtaggtatct cagtcggctg tagctcgtc cctccagct ggctcgtc caagaaaccc 3780
ccttcagcc cgaacgctgc gccttatcc gtaactatc tcttgactc aacccggtta 3840
gacacgactt atcgccactg gcagctgca cngtaacag gattagaga gcaggttat 3900
taggcgctgc tacagagttc ttgaagtgt ggcctaaata cggctacat agaagagag 3960
tattcggtat ctgcctctcg ctgaagccag ttaccttcg aaaaagagtt ggtagctctt 4020
gacccggcaa acaaacacc gcctgtagcg ctggctttt ttttgcacg cccagatta 4080
cgcacagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttatctt ttctacggcg tctgacccct 4140
agtggaacga aaactcaggt taaggatct tggctatgag attatcaaaa aggtattca 4200
ctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt ttaactaat cttaagtata tagagtaaa 4260
cttggtctga cagtaacaa tgcctaatca gtgaggaccc tatctcagcg actgctctat 4320
ttccttcac catagttgc tgaactcccg tctgttagat aactacgata cggagaggct 4380
tctctcgg cccagctct gaattgata tcccgaccc agctcacc cctccagat 4440
tatagcaat aaacagcca gctggaggg ccagagccag aagtggtct gaaattat 4500
cgcctccat ccagttctat aattgtgct ggaagctag agtaactagt tgcagctta 4560
aaagttgccc caaggttgtt gcaatgctc cagccatcgt cgtgtcagc tctgtgttg 4620
gtatgcttc attcagctcc gtttcacac gacaaacgc agttacatga tccccatct 4680
tgcacaaaa agcgtttgag tcttcgctc ccccgatcgt tctcagaaat ccgttcggcg 4740
caggtttatc actcaggtt agggagac tgcctaatc tcttctgtc atgcctatc 4800
taagatgctt tctgtgact ggtgagctc aaacagtc attctagaa taagtatgc 4860
ggcagccag tctctattgc ccgggttcaa taagggataa taaggcgca catagcagaa 4920
ttttaaagt gctcactatc ggaacagtt cttggggcg aaactctca aggtcttcc 4980
cgtgttgag atccagttcg atgtaaccc cctgtgccc cagtgatct tcaacatct 5040
ttactttcac cagcgtttct ggtgagcaa aaacaggaag gcaaaatgc gcaaaaaag 5100
gaataaggcg gacagggaaa tctgaatac tcaactctt cctttttcaa tattatgaa 5160

gcatttatca gggttattgt ctcatgagcg gatacatatt tgaatgtatt tagaaaaata 5220
aacaaatagg ggttcgcgcg acatttcccc gaaaagtgcg acctgacgcg cctgttagcg 5230
gcgcattaag cgcggcgggt gtgggtggta cgcgcagcgt gacgcctaca cttgccagcg 5340
ccctagegcg cgcctcttcc gcttctctcc ctctctctct cgcctacgtc gcgggcttcc 5450
cccgtaagc tctaaatcgg gggctccctt taggggtccg atttagtgcg ttacggcacc 5460
tcgaccccaa aaaacttgat tagggtagtg gttcacgtag tgggcctcgc cctgataga 5520
cggtttctcg ccttttgaag ttggagtcca cgttctttta tagtggactc ttgttccaaa 5530
ctggaacaac actcaacct atctcggctt attcttttga ttataaggcg attttgccga 5640
tttcggccta ttggttaaaa aatgagctga tttaacaaaa atttaacgcg aattttaaca 5700
aaatattaac gcttaacaatt tccattcgcc attcaggctg cgcactggt gggaaggcg 5760
atcggtgccg gcctcttcgc tattaagcca gctgatttaa atttaattaa ggcgcgcaca 5820
tggtatgatg ttaacatgca tgatatcag cgtggcgcca ctagtgctag cagatctggc 5880
cgcccccacg gtgggcacata tgggcgcgc 5909




FIG. 1

2/2




FIG. 2